

# おたふくかぜワクチン予防接種予診票

任意接種用

\*接種希望の方へ：太ワク内にご記入ください。

\*お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者をご記入下さい。

診察前の体温 \_\_\_\_\_ 度 分

住所			TEL( ) -
(フリガナ) 受ける人の氏名	( )	男・女	生年 大正・昭和・平成・令和 月 日 年 月 日生 ( 歳 カ月)
(保護者の氏名)			

質問事項	回答欄		医師記入欄
今日受ける予防接種について説明文を読んで理解しましたか。	いいえ	はい	
今日、体に具合の悪いところがありますか。	はい 具体的に( )	いいえ	
現在、何かの病気で医師にかかっていますか。 ・ その場合、治療(投薬など)を受けていますか。 ・ その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてもよいと言われましたか。	はい 病名( ) はい・いいえ	いいえ	
最近1ヵ月以内に病気にかかりましたか。	はい 病名( )	いいえ	
これまでに特別な病気(心臓血管系・腎臓・肝臓・血液疾患、免疫不全症、その他の病気)にかかり、医師の診察を受けたことがありますか。	はい 病名( )	いいえ	
これまでにけいれん(ひきつけ)を起こしたことがありますか。	はい ( )回くらい 最後は( )年( )月頃	いいえ	
これまでに薬や食品で皮膚に発疹が出たり、体の具合が悪くなったことはありますか。	はい 薬、食品の名前( )	いいえ	
近親者の中に予防接種を受けて、具合の悪くなった方はいますか。	はい 予防接種名( )	いいえ	
近親者の中で先天性免疫不全症と診断された方がいますか。	はい	いいえ	
最近1ヵ月以内に家族や周囲で麻疹、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった方がいますか。	はい 病名( )	いいえ	
最近1ヵ月以内に予防接種を受けましたか。	はい 予防接種の種類( )	いいえ	
これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことがありますか。	はい 予防接種名・症状( )	いいえ	
最近6ヶ月以内に輸血あるいはガンマグロブリンの注射を受けましたか。	はい 理由( )	いいえ	
(接種を受けられる方がお子さんの場合)分娩時、出生児、乳幼児健診などで異常がありましたか。	はい 具体的に( )	いいえ	
(女性の方に)現在妊娠しているあるいは妊娠している可能性がありますか。 注：接種後2ヵ月間は妊娠をしないように注意して下さい。	はい	いいえ	
その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことや今日の予防接種について質問がありますか。	はい 具体的に( )	いいえ	

医師の記入欄：以上の問診および診察の結果、今日の予防接種は(可能・見合わせる)。 医師の署名または記名捺印  
本人(もしくは保護者)に対して、予防接種の効果、副反応および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について説明した。

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応の可能性などについて 本人の署名(もしくは保護者の署名)  
理解した上で、接種することを(希望します・希望しません)。  
(被接種者が自署できない場合、代筆者が署名し、被接種者との続柄を記載ください。) \_\_\_\_\_  
代筆者の場合：続柄 \_\_\_\_\_

使用ワクチン名	用法・用量	実施場所・医師名・接種年月日
名称：おたふくかぜ生ワクチン 製造番号：	皮下接種  ml	実施場所：医療法人社団 千風会 なかじま整形外科小児科クリニック 医師名： 中島 由佳 接種年月日： 年 月 日

記載いただきました個人情報はワクチン接種の予診に関してのみ使用致します。

# おたふくかぜワクチンの接種をご希望の方へ

おたふくかぜワクチンの接種を実施するにあたり、接種を受けられる方の健康状態を把握する必要があります。そのため、予診票に出来るだけ詳しくご記入の上、医師の診察をお受け下さい。なお、お子さまの場合、健康状態をよく把握している保護者の方がご記入下さい。

## ワクチンの効果と副反応

おたふくかぜワクチンはムンプスウイルスを弱毒化した生ワクチンで、接種後に体の中でワクチンウイルスが増え、約90%の人に抗体ができます。

一方、ワクチン接種に伴う副反応として、接種部位が赤くなる、腫れることがあります。通常、一過性で2～3日中に消失します。また、接種後2～3週間ごろに、発熱、耳下腺の腫れ、嘔吐、咳、鼻汁などの症状があらわれることがあります。通常、数日中に消失します。非常にまれですが、次のような副反応が見られることがあります。

- (1)ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)無菌性髄膜炎(接種後3週間程度)、(3)急性散在性脳脊髄炎(接種後2週間程度で発熱、頭痛、けいれん、運動・意識障害など)、(4)脳炎・脳症、(5)血小板減少紫斑病(紫斑、鼻出血、口腔粘膜出血など)、(6)難聴、(7)精巣炎(精巣腫脹など)、(8)急性膵炎(腹痛、発熱、嘔気・嘔吐など)

なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うことになります。

## 予防接種を受けることが出来ない方

1. 明らかに発熱のある方(通常は37.5℃を超える場合)
2. 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
3. 過去におたふくかぜワクチンの接種により、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のひどいじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと)を起こしたことがある方
4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患にかかっている方および免疫抑制をきたす治療を受けている方
5. 妊娠していることが明らかな方
6. その他、医師が予防接種を受けることが不相当と判断した方

## 予防接種を受ける際に医師と相談していただく方

1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害など基礎疾患のある方
2. 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性の発疹などのアレルギーを疑う症状がみられた方
3. 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
4. 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある方、又は近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
5. 本剤の成分(主にエリスロマイシン、カナマイシンの抗生物質)に対してアレルギーを起こす可能性のある方
6. 薬の服用または食事で発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある方

## 予防接種を受けた後は以下の点に注意してください

1. 接種後30分間は、アレルギー反応(息苦しさ、じんましん、せきなど)が起こることがありますので、医師とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。
2. 副反応(発疹や発熱などの過敏症状)が接種直後から翌日に出現することが知られています。接種後1日は体調に注意しましょう。
3. 接種後、4週間ほどは副反応の出現に注意しましょう。
4. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
5. 接種当日はいつもの生活をしましょう。接種後は接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
6. 妊娠が可能な人は、接種後2ヵ月間は妊娠をしないように注意しましょう。